

Gebruik Cubitan® als essentieel onderdeel van de versnelde wondheling bij decubitus⁴

	Gedurende minimaal 8 weken	Aantal flesjes per dag
	Categorie I: Niet-wegdrukbaar roodheid bij een intacte huid	
	Categorie II: Verlies van een deel van de huidlaag of blaar	
	Categorie III: Verlies van een volledige huidlaag (vet zichtbaar)	
	Categorie IV: Verlies van een volledige weefsellaag (spier/bot zichtbaar)	

3 verschillende smaken*:



CHOCOLADE





AARDBEI



VANILLE

*enkel met aroma's



Contra-indicatie ICU

Wenst u meer informatie?

Contacteer Nutricia Advanced Medical Nutrition

070/222.307

medical.nutrition@nutricia.be

www.nutriciamedical.be

NUTRICIA
Cubitan

YU-Nutricia N.V. PB100011850 Grimbergen. Dieetvoeding voor medisch gebruik bij de dieetbehandeling van decubitus. Dient onder medisch toezicht te worden gebruikt. 5003661/sept. 2016/Uitsluitend bestemd voor (para)medici


CUBITAN®

Verbeterde wondheling bij decubitus



Decubitus heeft verstrekkende gevolgen en vraagt om een multidisciplinaire aanpak^{1,2}

Specifieke voeding is belangrijk in de multidisciplinaire aanpak van decubitus³



1. Wissing U, Ek AC, Unosson M. A follow-up study of ulcer healing, nutrition, and life-situation in elderly patients with leg ulcers. J Nutr Health Aging 2001; 5:37-42.

2. Moffat: European Wound Management Association (EWMA). Position Document: Hard-to-heal wounds: a holistic approach. London: MEP Ltd, 2008.

3. NPUAP, EPUAP and PPIA. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Perth, Australia; 2014.

* Bij risico op ondervoeding

** 30 tot 35 kcal/kg lichaamsgewicht


*** 1,25 à 1,5 g eiwit/kg lichaamsgewicht

Cubitan® bewezen bij te dragen aan een betere wondheling⁴

Cubitan® en Cubison® zijn volledig in lijn met de EPUAP guidelines


ANNALS OF INTERNAL MEDICINE

Cubitan® resulteert in een significant grotere reductie van het wondoppervlak⁴



Nieuwe studie

Cubitan® essentieel onderdeel van versnelde wondheling bij decubitus⁴



17% van de patiënten in de Cubitan® groep had een volledige wondgenezing na 8 weken⁴

4. Cereda E, Klersy C, Serjoli M, et al. OligoElement Sore Trial Study (OEST) Group. A nutritional formula enriched with arginine, zinc, and antioxidants for the healing of pressure ulcers: a randomized trial. Ann Intern Med 2015;162:167-74.

NUTRICIA
Cubitan®